

Compliance aux directives de prise en charge du paludisme par les prescripteurs en Côte d'Ivoirekkk

Attia Konan Akissi Régine, Hounsa Alla Annita, Kouamé Jérôme, Koffi Kouamé, Koménan Kouamé Armand Serge, Sackou KouakouJulie Ghislaine, Oga Agbaya Serge Stéphane

Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt

Introduction


Paludisme : défi de santé publique en Afrique subsaharienne (**92%% des cas de paludisme et 93%% des décès**).

En Côte d'Ivoire : premier motif de consultation et d'hospitalisation (incidence de 154,58‰, 3222 décès soit 80% des décès dus au paludisme dans le monde).

Stratégie d'élimination du paludisme

Renforcement et optimisation de la détection et de la prise en charge des cas : mise à disposition des Combinaisons thérapeutiques à base d'Artémisinine (CTA) et Tests de Diagnostic Rapide (TDR).

Carte mondiale du paludisme
Estimation du CDC



Introduction


Système d'approvisionnement dans le secteur public : centrale d'achat national par un processus de quantification (hypothèses cliniques et de consommation).

Défi : disponibilité effective des produits de santé (rupture de 60% en 2019)

Causes multiples : **prescription irrationnelle des produits de santé**. 6699

Non respect des directives nationales

Objectif : évaluer la compliance des pratiques de prescription avec les directives du programme National de Lutte contre le paludisme.



Matériel et Méthodes

Cadre de l'étude : Région sanitaire Abidjan 2 , Cocody-Bingerville et Koumassi (septembre à novembre 2022)


Population :

- Ordonnances de 2021, 2022
- Prescripteurs
- Patients

Echantillonnage : Méthodologie de l'OMS/HAI
8 ESPC, 480 ordonnances, 120 patients.

Outils : grille de lecture, questionnaire

Directives : CTA après confirmation du paludisme (TDR, microscopie)




Résultats

Profil de prescription

Paludisme simple : AL la plus prescrite (58%)

Préférence de 28 prescripteurs : 82,1% pour AL




Résultats

Conformité des prescriptions

Près de 7 ordonnances sur 10 étaient non conformes

Taux de non conformité fonction du métier (p<0,01) : plus élevé chez les infirmiers (34%).




	Conforme (n,%)	Non conforme(n,%)	Total
MEDECIN	179 (74)	63 (26)	242
IDE	148 (66)	75 (34)	223
SAGE FEMME	12 (80)	3 (20)	15
Total	339	141	480

Résultats


Eléments de non conformité

- Tests de confirmation : près de 3 ordonnances sur 10
- Prescription : Durée du traitement +++

Demande de tests de confirmation



Non conformité au niveau de la prescription



Résultats

Éléments associés aux pratiques de prescription :

Prescripteurs


- Adhésion aux directives : Accord (88,7%), Désaccord (9,4%)
- Dernière formation sur les directives nationales : 46% formés depuis plus d'1 an.

Patients

- Préférence pour AL (tolérance meilleure) : 74%.

Stocks

- Ruptures : 240 (2021), 238 (2022) AL+++



Conclusion

- Compliance aux directives de prise en charge du paludisme pas satisfaisante :
obstacle dans la lutte contre le paludisme
- Surprescription en AL avec **un risque de résistance à la CTA**
- Tension sur les stocks de médicaments : ruptures importantes surtout pour AL avec risque de mauvaise prise en charge ou **prescription de CTA dans le secteur privé (accessibilité financière)**.

Conclusion

Orientations de la stratégie : améliorer l'utilisation rationnelle des médicaments

Cible des prescripteurs

- ✓ Formation accentuée chez les infirmiers
- ✓ Encourager le remplissage des fiches de pharmacovigilance afin de documenter les effets secondaires liés à l'utilisation des autres CTA (ASAQ...)

Compliance aux directives de prise en charge du paludisme par les prescripteurs en Côte d'Ivoirekkk

Attia Konan Akissi Régine
attiaregcigmail.com

Merci de votre attention